

Virkelighedshistorie: Poul



Modelfoto

Poul Hansen 57 år. Poul fik konstateret type 2 diabetes som 51-årig, havde de klassiske symptomer med tørst og hyppig vandladning, var overvægtig. Egen læge satte Poul i tabletbehandling, og han var ved diætist og øjenlæge. De næste 5 år var Poul ved læge ca. 1 gang om året, hvor der blev taget blodsukker. Lægen sagde bare, at det lå fint. Han fik ikke at vide, hvad det var, lægen sagde kun, at det var fint, at han havde tabt 10 kg.

For 3 mdr. siden blev Poul indlagt med en blodprop i hjernen, blodsukkeret var 25. Poul var lammet i venstre side. Under indlæggelsen blev tabletbehandlingen øget, og han fik lidt orientering om diabetes og besked på at købe et blodsukkerapparat og så kontakte egen læge.

Hjemmesygeplejersken blev af ergoterapeuten bedt om at kontakte Poul angående blodsuktermålingsapparat og måling. Poul er blevet genoptrænet så meget, at han kan gå lidt rundt med albuestok, venstre arm er stadig lammet.

- Hvilke informationer har Poul brug for at få, så han får mere forståelse for diabetes og egenomsorg?

- Hvad er egen læges opgave i Pouls situation?

- Hvad skal ægtefællen hjælpe med og vide omkring Pouls diabetes.