

Virkelighedsbillede – Tage



En 67-årig mand møder til diabeteskontrol en mandag lige efter frokost. Han har gået til kontrol i ambulatoriet i 4 år for tabletbehandlet diabetes.

Han virker konfus, men kan oplyse egne data. Der måles blodglukose, som er 2,8 mmol. Trods rigelig æblejuice og brød holder blodglukosen sig stadig nede på 2,9 mmol efter en time, og Tage indlægges.

På afdelingen opsættes et glukosedrop, da Tage virker dehydreret. Da blodglukosen er steget til 4,3 mmol. tages droppet fra, og Tage er oppegående til aften. Tage vælger suppe ved aftenbuffeten.

1/2 time efter findes han liggende i elevatoren - meget konfus - med et blodglukose på 1.8 mmol og behandles straks med glukose intravenøst. Først næste dag bliver Tage rigtig sig selv igen, og blodglukosen forbliver stabil i normalområdet.

**ÅRSAG: Tages kone, som normalt står for mad og medicin, har været indlagt på et andet hospital en uge og har nøje indprentet ham at tage tabletterne, som hun har lagt i ugedoseringsæsker. Han er alene, har været meget på besøg på hospitalet og han har spist minimalt...
MEN HAN HAR HUSKET AT TAGE SINE TABLETTER!**